

## POSTUPANJE S OBOLJELIMA, BLISKIM KONTAKTIMA OBOLJELIH I PREKID IZOLACIJE I KARANTENE

<https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/11/Postupanje-s-oboljelima-bliskim-kontaktima-oboljelih-i-prekid-izolacije-i-karantene-ver18-1.pdf>

### - *Dodatna tumačenja*

S obzirom na učestale upite vezane uz aktualnu 18. verziju „Postupanja s oboljelima, bliskim kontaktima oboljelih i prekid izolacije i karantene“ od 24. siječnja 2022. godine, ovdje donosimo dodatna tumačenja izmjena u odnosu na prethodnu verziju:

Karantene su oslobođena djeca do 18 godina starosti koja su primarno cijepljena i koja su preboljela pa primila jednu dozu cjepiva, neovisno o tome koliko je vremena prošlo od cijepljenja:

- Izuzeće na temelju preboljenja unatrag četiri mjeseca nije ukinuto za djecu do 18 godina starosti, te je izuzeće nakon preboljenja za djecu jednako kao za odrasle i nepromijenjeno u odnosu na prethodnu verziju ovog dokumenta (tablica 1. u dokumentu).
- Dodano je novo izuzeće od karantene za djecu koja su primila dvije doze cjepiva ili preboljele i primile jednu dozu cjepiva, neovisno o tome koliko je vremena prošlo od cijepljenja (bez dosadašnjeg ograničenja na 4 mjeseca od primarnog cijepljenja), jer se za zdravu djecu za sada ne preporučuje *booster* doza (tablica 1. u dokumentu).

Zdravstveni djelatnici i djelatnici u sustavu socijalne skrbi kojima je na temelju ranijeg preboljenja ili cijepljenja karantena skraćena na sedam dana trebaju prije povratka na posao uraditi brzi antigenski test (može i PCR ako kapaciteti testiranja dozvoljavaju) te se na posao mogu vratiti tek po dobivanju negativnog rezultata testa:

- Za sve osobe koje su preboljele ili završile cijepljenje prije više od 4 mjeseca karantena traje sedam dana, bez potrebe za testiranjem ako osoba ne razvije simptome. Izuzetak su djelatnici u zdravstvu i socijalnoj skrbi, koji trebaju sedmi dan karantene ishoditi negativan rezultat u BAT-u ili PCR-u prije povratka na posao (tablica 2. u dokumentu).

Izolacija je skraćena asimptomatskim i osobama s blagom do umjerenom kliničkom slikom koje nisu imunokompromitirane na sedam dana i za osobe kojima je prošlo više od četiri mjeseca od primarnog cijepljenja ili preboljenja:

- U ranijoj verziji asimptomatskim i osobama s blagom do umjerenom kliničkom slikom izolacija je bila skraćena na sedam dana ako su bili cijepljeni ili su preboljeli unatrag četiri mjeseca.



# HZJZ

- Prema ovim novim preporukama izolacija je skraćena na sedam dana svim osobama sa završenim primarnim cijepljenjem (s i bez *booster* doze) i svim osobama koje su preboljele neovisno koliko je vremena prošlo od preboljenja i cijepljenja (str. 6 u dokumentu).
- Osobama koje nisu cijepljene i nisu preboljele neovisno o dobi izolacija traje najmanje 10 dana pa i kada su bez simptoma bolesti ili kada imaju blagu do umjerenu kliničku sliku (str. 6 u dokumentu).

NAPOMENA: U ovom dodatnom tumačenju su navedena samo pojašnjenja izmjena u odnosu na prethodnu verziju, dok je za očuvanje života i zdravlja građana nužno uzeti u obzir i primjenjivati dokument u cijelosti.